

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ)

Č.j.: 1MSKV/Ř 154/2015

Pokyn ředitelky mateřské školy č.1/2015 „K preventivnímu opatření proti onemocnění žloutenkou typu A ve školách a školských zařízeních“

Ředitelka 1. MŠ vydává s okamžitou účinností tento pokyn na základě doporučení primátora města Ing. Petra Kulhánka ze dne 9.6.2015 týkající se doporučení k preventivnímu opatření proti onemocnění žloutenkou typu A a vysokého stupně nebezpečí. Ředitelka 1. MŠ ukládá všem *VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM* (VUOP, VŠJ) prokazatelně informovat na nástěnkách a infotabulích v areálech jednotlivých OP všechny zaměstnance 1. MŠ a jejich odloučených pracovišť, včetně školních jídelen, všechny děti navštěvující jednotlivá OP a jejich zákonné zástupce, všechny ostatní návštěvníky 1. MŠ následovně (INFORMACE BUDE ZVEŘEJNĚNA I NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 1. MŠ):

1. Obecné informace:

Hepatitida je zánět jater, nejčastěji bývá způsobena virovými původci. Virová hepatitida A neboli žloutenka typu A bývá označována také jako nemoc špinavých rukou. Jedná se o celosvětově rozšířené virové onemocnění, riziko nákazy je vyšší v zemích s nízkým hygienickým standardem a v přímořských státech. V ČR se jednou za čas objeví lokální epidemie žloutenky, především po povodních. Po epidemii v roce 2008 byly ještě následující 2 roky hlášeny několikanásobně vyšší počty případů onemocnění. I mimo epidemie jsou však u nás každoročně hlášené desítky případů nákazy. Původcem nákazy je virus hepatitidy A (HVA).

2. Zdroje nákazy a šíření nemoci:

Zdrojem nákazy jsou lidé akutně nemocní a bezpříznakoví nosiči (nemocní bez vnějších projevů onemocnění). Záludnost tohoto onemocnění spočívá především v jeho snadném přenosu. Cesta přenosu je přímým kontaktem s infikovanou osobou, dále kontaminovanou vodou, ledem v nápojích, zeleninou, ovocem a syrovými mořskými plody, zvláště mušlemi, špatně tepelně zpracovaným masem i dotekem s kontaminovanými předměty. Zdrojem nákazy jsou i lidé v inkubační době - nemocný člověk před nástupem prvních příznaků. Importovaná onemocnění mohou být zdrojem nákazy dalších osob. Inkubační doba je dlouhá, 15-50 dní, průměrně 28 dní. Virus žloutenky A je ve stolici přítomen již v inkubační době, je ve slinách, v sekretu z nosohltanu a v moči. Virus vydrží při teplotě 25° C v suchém prostředí a ve vodě 30 dní, var ho ničí až za 5 minut, aktivní chlor za 15 minut a UV záření za 60 vteřin.

3. Doporučení MSMT pro preventivní opatření:

- a) učitelky informují žáky o prevenci žloutenky typu A (možno využít obecné informace). *Žloutenka je nemocí špinavých rukou, hlavní roli při jejím šíření hraje přenos stolicí člověka, a proto je nejdůležitějším preventivním opatřením důkladné mytí rukou.*
- b) školní jídelna vyloučí ze svého jídelníčku podávání syrového ovoce a zeleniny, které si dítě musí samo oloupat
- c) mateřská škola zajistí dostatečné množství hygienických a dezinfekčních prostředků pro úklid, školní kuchyni a školní zahradu; vedoucí pracovníci poučí všechny zaměstnance o způsobu používání dezinfekčních prostředků při úklidu
- d) pracovníce školní jídelny budou postupovat podle pokynů vedoucí školní jídelny (volba jídelníčku, hygienické zásady, úklid)

- e) opatření budou zveřejněna na přístupném místě i pro další osoby pohybující se v prostorách 1. MŠ

S tímto pokynem seznámí vedoucí pracovnice neprodleně a prokazatelně všechny svoje zaměstnance, písemně doloží na prezenční listině ředitelce mateřské školy do 15.6.2015

V Karlových Varech 10.6.2015

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy